الادارة الفنية

<table>
<tr><th>العنوان</th><th>المعلومات</th></tr>
<tr><td>الاسم التجاري</td><td>سويفت 500 اس جى</td></tr>
<tr><td>المادة الفعالة</td><td>ثيوسيكلام هيدروجين اوكسلات 50 %</td></tr>
<tr><td>الشركة المنتجة</td><td>وليوود</td></tr>
<tr><td>بلد المنشأ</td><td>الصين</td></tr>
<tr><td>وصف المبيد</td><td>مبيد حشري يؤثر على الحشرات بالملامسة و كسم معدى</td></tr>
<tr><td>معدل الاستخدام</td><td>
<table>
<tr><th>المحصول</th><th>الآفة</th><th>معدل الاستخدام</th><th>فترة التحريم</th></tr>
<tr><td>الطماطم و البطاطس</td><td>الذبابة البيضاء – صانعات الانفاق – عثة درنات البطاطس – التربس</td><td>50 – 100 جم/100 لتر ماء</td><td>7 أيام
21 يوم</td></tr>
<tr><td>التفاح – الكمثرى</td><td>صانعات الأنفاق – حفار أوراق التفاح – سوسة الازهار</td><td>50 – 100 جم/100 لتر ماء</td><td>21 يوم</td></tr>
<tr><td>نباتات الزينة</td><td>التربس - الذبابة البيضاء، صانعات الانفاق</td><td>75-100 جم/100 لتر ماء</td><td>.....</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>محددات الاستخدام</td><td>- لا يسمح برعي الماشية في المناطق المعاملة أو تقديم العلف المعامل قبل مرور 12 يوم على الرش.
- قد يحدث تسمم للطماطم في البيوت البلاستيكية إذا ما استخدم بطريقة متكررة أقل من 14يوم بين الرشتين في درجات الحرارة العالية.
- قد يحدث تسمم للأصناف الحمراء من التفاح.
- نظرا لوجود الأصناف العديدة من نباتات الزينة فانه ينصح بإجراء اختبار لتحمل النبات قبل الرش على نطاق واسع.
- لا ترش نباتات الزينة أثناء مرحلة الإزهار.</td></tr>
</table>